## Choisir d'avoir un enfant ou non.

La contraception : Ensemble des méthodes utilisées pour éviter, de façon réversible, une grossesse. La contraception peut être chimique ou mécanique.

Orlane, Elina et Mackenzie

# Comment éviter une grossesse par une contraception à court terme ?

## Le préservatif masculin

Les préservatifs servent à éviter toutes les maladies sexuellement transmissibles il sert aussi à empêcher les grossesses, le préservatif se déroule sur le pénis en érection avant la pénétration et retient le sperme. Les préservatifs peuvent se déchirer pendant le rapport sexuel.

On Peut facilement se procurer des préservatifs masculin en pharmacie, sur internet, dans les cafés, dans les stations services, grandes surfaces, dans distributeurs et auprès des infirmières scolaires.

Les préservatifs ne nécessitent pas de prescription médicales.

Les préservatifs sont fait en latex et pour ceux qui y sont allergique il en existe en polyuréthane.



Benjamin Pichon et Noa Riche


## Le préservatif féminin

ANNEAU INTERIEUR

CONDOM FETININ

- Le préservatif féminin est à la fois un mode de contraception et une protection contre les infections sexuellement transmissibles.
- On peut l'insérer dans le vagin plusieurs heures avant le rapport sexuel.
- Il permet à la femme de maîtriser sa sexualité et de ne pas dépendre de son partenaire pour se protéger.

Le préservatif féminin empêche que les spermatozoïdes pénètrent le vagin. Donc de tomber enceinte. On peut le trouver dans les pharmacies (sans ordonnance), au planning familial et dans les centres de dépistage anonymes et gratuits mais aussi auprès des infirmières scolaires.



## La cape cervicale et le diaphragme

La cape cervicale et le diaphragme (en silicone ou en latex) est une protection qui se glisse dans le vagin, au contact du col de l' utérus.



La cape cervicale et le diaphragme empêchent l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus.(= ne pas tomber enceinte)



On se les procure en pharmacie sous ordonnance .On peut aussi se les procurer en CEPF(centre de planifications et d'éducation familiale) après consultation chez un médecin.

Imaine En Naji Nouhaïla arrachidi

# Les spermicides

### **Description**

Ils peuvent être sous forme de gel (crème) ou de pilules (ovules) que l'on insère au fond du vagin.

### Comment agissent-ils?

Ils détruisent ou rendent inactifs les spermatozoïdes. Utilisés seuls, leur taux d'échecs est assez élevé, entre 18 et 19%, donc il faut l'utiliser en complément d'un autre moyen de contraception.

### Où se les procurer?

On peut trouver des spermicides en pharmacie.

### **Autres**

La durée d'efficacité est variable en fonction du genre de spermicide utilisé, la crème peut durer environ 8 heures, tandis que les ovules durent environ 1 heure.

# Comment éviter une grossesse par une contraception à long terme ?

## La pilule contraceptive Ayla Atas, Océane Labat

### **Description:**

Les pilules contiennent des hormones qui ressemblent a celles qui fabriquent naturellement les ovaires. Toutes les pilules contiennent une ou deux hormones similaires aux hormones féminines naturelles.



#### Où se le procurer:

La pilule peut être prescrite par un médecin ou une sagefemme et est délivrée sur ordonnance en pharmacie.

Selon le type de pilule, le coût est de 1,88 à 14 €\* par mois. Certaines pilules sont remboursées à 65%. Il en existe aussi des génériques.

#### Son action:

La pilule est un médicament sous forme de comprimés:

Si on la prend selon le mode d'emploi et sans oubli,elle évite une grossesse non désirée. Attention,elle ne protège pas des infections sexuellement transmissibles,on doit quand même se protéger avec un préservatif.



## Les implants, patch et anneaux contraceptifs.

Le patch: Le patch est un timbre qui se colle sur la peau et qui contient une association similaire à celle d'une pilule combinée. Les deux hormones pénètrent dans le sang à travers la peau.


Un anneau: L'anneau vaginal est un anneau flexible en plastique qui contient une association d'hormones. On l'insère au fond du vagin et à la chaleur du corps, les hormones diffusent à travers la paroi vaginale et passent dans le sang.

Un implant: L'implant est un petit bâtonnet cylindrique, en plastique, de 4 cm de long et 2 mm de largeur (la taille d'une allumette). C'est un réservoir contenant les mêmes hormones que les pilules contraceptives.

Le patch, l'anneau vaginal et l'implant peuvent être prescrit par un médecin ou une sage-femme, donc sous ordonnance à la pharmacie.



L'action de ces moyens contraceptifs est d'éviter une ovulation. Ceux ci seraient plus efficaces qu'une pilule car les femmes concernées l'auraient toujours sur elles. (pas de risque d' oublie)






# Le dispositif intra-utrérin (D.I.U)

Le d.i.u est un petit objet en matière plastique en forme T qui est placé dans l'utérus pour prévenir la grossesse.

La partie plastique qui,régulièrement,entre en contact avec la paroi utérine (sensation non perceptible par la femmes),empêche la nidation. Le cuivre, avec le temps, renforce l'inaptitude de la paroi de l'utérus à accueillir l'embryon; il est également toxique pour les spermatozoïdes,renforçant ainsi l'efficacité contraceptive.

Il se place dans l'utérus par un médecin après qu'il ait été prescrit.



Dans le cas d'un rapport sexuel non protégé, d'un oubli ou d'une mauvaise utilisation d'un contraceptif donc en urgence, existe-t-il un moyen d'éviter une grossesse ?

## La pilule du lendemain. (Seju et Raymond)

C'est un médicament utiliser après des rapports sexuels sans préservatifs ou un oubli de prendre la pilule. cette pilule n'est utilisable qu'une seule fois.



On peut la trouver en pharmacie ou cher le médecin généraliste ou gynécologue, pharmacien, infirmière scolaire, sage-femme. Elle est gratuite pour les mineures.

La pilule du lendemain sert à ce que l'embryon qui forme la progéniture disparaisse, elle peut empêcher également l'ovulation. On peut l'utiliser jusqu'à 72h après le rapport sexuel maximum. Ce moyen de contraception doit être exceptionnel.



### Conclusion:

Un groupe d'adolescents discute de contraception :

- -Béatrice : pour ne pas être enceinte, c'est facile; je compte 14 jours après mes règles et je n'ai pas de rapport ce jour là. Tu as faux, les règles ne sont pas régulières.
- -Caroline: moi je ne compte pas, je prends une pilule le lendemain du rapport sexuel. Tu as juste mais il faut absolument que tu la prennes avant les quatre jours qui suivent.
- -Françoise : ben moi, j'en prends une tous les jours. Non, c'est trop.
- -Bertrand : mais est-ce que vous auriez besoin de tout cela si le garçon mettait un préservatif ? Il faut mieux que les femmes se protègent aussi.

